

ALLONTANAMENTO DAL NIDO

I bambini potranno essere allontanati dal nido se presenteranno anche uno dei seguenti sintomi:

- ✓ FEBBRE UGUALE O SUPERIORE A 37.5° misurata in sede ascellare eventualmente riprovata alla presenza del genitore;
- ✓ VOMITO ripetuto (2 o più episodi nelle ultime 20 ore), non dovuto a tosse, anche in assenza di febbre e diarrea;
- ✓ DIARREA: scariche frequenti (almeno 3) di feci liquide, maleodoranti. Se è presente muco o sangue o è in atto un'epidemia di gastroenterite è sufficiente una sola scarica;
- ✓ DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA, PIANTO PERSISTENTE, IRRITABILITÀ, STATO DI SOFFERENZA;
- ✓ ESANTEMA DA SOSPETTA MALATTIA INFETTIVA, con febbre o con alterazioni comportamentali;
- ✓ CONGIUNTIVITE non in trattamento;
- ✓ STOMATITE AFTOSA, con o senza febbre;
- ✓ OSSIURI (vermi);
- ✓ MALATTIA CUTANEA non in trattamento;
- ✓ SOSPETTA PEDICULOSI (pidocchi).

Dopo l'allontanamento si dovrà contattare il proprio Pediatra di base. Per la riammissione sarà necessario compilare l'autocertificazione per sintomi

FONTI:

“criteri generali per l' allontanamento” , punto 3, pag 7 , da Asur Marche 3, Prot. N° 8602/DP/SISP , del 23/01/2018